


Klinimetrie Nekpijn (2016) Optionele meetinstrumenten

www.meetinstrumentenzorg.nl



Toelichting 4DKL = Vier Dimensionale Klachten Lijst; CCFT = Cranio Cervicale Flexie Test; CROM = cervicale range of motion; FABQ = Fear Avoidance Belie-
ves Questionnaire; NBQ = Neck Bournemouth Questionnaire; NDI = Neck Disability Index; SF-36 = Short Form 36; TSK = Tampaschaal voor Kinesiofobie;
VAS = Visuele analoge schaal.
cursief = performancetest/functietest; niet cursief = vragenlijst/observatielijst

* De TSK en 4DKL staan nu bij persoonlijke factoren, ze kunnen echter ook gezien worden als (mentale) functies.

U vindt bovenstaande meetinstrumenten op www.meetinstrumentenzorg.nl.

Verantwoording

In de *KNGF-richtlijn Nekpijn* worden meetinstrumenten genoemd die fysiotherapeuten kunnen gebruiken in het diagnostisch en therapeutisch proces, bij patiënten met nekpijn (Bier et al. 2016).

Deze meetinstrumenten zijn door het KNGF geordend conform de *International Classification for Functioning, Disability and Health* (ICF). De uitkomst is een schema waarin per ICF-component is opgenomen met welk doel (diagnostisch/prognostisch/evaluatief) welk meetinstrument kan worden ingezet. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen aanbevolen meetinstrumenten en optionele meetinstrumenten.

Bovenstaande figuur ordent de optionele meetinstrumenten.

Aanbevolen meetinstrumenten: zie *Klinimetrie Richtlijn Nekpijn (2016): Aanbevolen meetinstrumenten*.

Bron: Toepassing van het 'Raamwerk klinimetrie voor evidence based products' om meetinstrumenten te ordenen in de KNGF-richtlijnen – maart 2015.